

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

(R)

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 15-6-85526-46

## ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE"

(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35000 RENNES — Tél. (99) 36-01-74

ABONNEMENT ANNUEL 125 F

Sous-Régisseur de recettes de la D. D. A.

PROTECTION DES VÉGÉTAUX

C. C. P. RENNES 9404-94 Y

BULLETIN "CULTURES MARAÎCHÈRES, LÉGUMIÈRES ET

12 JUIN 1985

POMMES DE TERRE" n° 115 -

- DES PUCERONS .... sur de nombreuses cultures
- PEPINIÈRES DE CHOUX : Mildiou, Mouche
- POMMES DE TERRE : Le Mildiou menace
- ATTENTION AUX INTOXICATIONS

### PUCERONS

Les pucerons se multiplient activement sur diverses cultures légumières ou maraîchères, en particulier sur :

- **POIS** : Des pullulations sont observées dans certains secteurs. Si leur présence est constatée, effectuez un traitement avec un produit autorisé sur cultures légumières et non dangereux pour les abeilles :

• bromophos (Nexion, Sovi-Nexion, Rhodianex)

- phosalone (Azofène, Zolone)
- pyrimicarbe (Pirimor G)

- **CAROTTES** : Quelques pucerons peuvent faire de sérieux dégâts sur les jeunes semis.

Surveillez vos cultures pour intervenir dès l'apparition des premiers insectes.

- **CULTURES DE SERRE** : Tomates, melons, concombres ...

Des colonies de pucerons parfois importantes sont présentes dans certaines cultures sous serre.

• En lutte biologique, prenez le pyrimicarbe (Pirimor)

• En lutte chimique, les produits utilisables sur cultures légumières sont nombreux. Respectez scrupuleusement les délais d'emploi avant récolte.

### PEPINIÈRES DE CHOUX

Les premières attaques de Mildiou sont constatées ainsi que des dégâts de Mouche.

La protection de la pépinière contre maladies et insectes doit être continue, c'est la condition nécessaire pour obtenir une culture en bon état sanitaire.

- **MALADIES** : Dès la levée, traitez avec Dithane ou Sandozèbe associé à Rovral ou Kidan et renouvelez ce traitement tous les 7 jours jusqu'au stade 1 feuille vraie et au delà tous les 14 jours.

- **INSECTES** : Intervenez avec Thiodan, Ultracide, Rhodiatox, Birlane ...

## POMMES DE TERRE

- **MILDIU** : La protection doit être maintenue, car le temps actuel est favorable à la maladie.

Plusieurs échantillons de feuilles de pommes de terre de conservation ou de

semence atteintes de Mildiou nous sont déjà parvenues.

Suivez les indications données dans le bulletin n° 114 du 7 juin.

### ATTENTION AUX INTOXICATIONS

- Ne pas traiter aux heures de plein soleil
- Pendant le traitement, portez des vêtements de travail (ne jamais traiter torse nu), des gants imperméables, des lunettes de protection; Evitez l'inhalation des vapeurs et le contact des produits avec la peau. Le port d'un masque est recommandé.
- Ne fumez pas.
- Ne traitez pas sous le vent.
- En cas de souillure de la peau, lavez immédiatement à l'eau et au savon.
- Changez de vêtements après le traitement. Rincez-vous les mains et le visage avant de prendre toute nourriture.
- Ne laissez pas traîner les emballages vides qui doivent être détruits.

**DERNIERE NOTE** : Bulletin n° 114 du 7 juin 1985